



Numéro d'article	023178
Prix HT	7,77 €
Prix TTC	9,40 €
Stock	en stock

Description

Kendall Excilon AMD, coussinet anti-adhésif avec PHMB.

Utiliser pour soigner les entrées d'air lors de l'utilisation de cathéters et de drains et pour prévenir l'infection des plaies.

La serviette hygiénique non tissée stérile à 6 couches contient 0,2 % de PHMB (polyhexaméthylène biguanide) en tant que composant antimicrobien. Le PHMB résiste à la colonisation bactérienne dans le pansement. Le PHMB réduit la pénétration des bactéries dans le pansement. Avec l'ajout de PHMB, le cataplasme fractionné a un effet à large spectre ; il offre une protection contre les micro-organismes à Gram négatif, à

Gram positif et à spores, dont le SARM (bactérie, staphylocoque doré résistant à la méthicilline) et les ERV (bactérie, entérocoque résistant aux vancomycines). Cela limite la contamination à d'autres personnes. La compresse fendue n'est pas adhérente, de sorte qu'une fois enlevée, la plaie n'est pas endommagée. Le tampon est muni d'une fente avec laquelle le cathéter ou le drain peut être correctement fermé.

Kendall Excilon AMD - propriétés :

- PHMB (polyhexaméthylène biguanide) - antimicrobien
- résiste à la colonisation bactérienne
- réduit la pénétration bactérienne avec un large spectre d'action
- contamination croisée limitée
- non adhésif ; la plaie ne sera pas endommagée si on l'enlève
- 6 couches
- La fente offre un bon cathéter de confinement ou de drainage.
- stérile

Application :

Pour le soin des orifices d'insertion lors de l'utilisation de cathéters et de drains et pour prévenir l'infection des plaies.

Comment appliquer la compresse split ?

Préparation :

- Lavez-vous et désinfectez vos mains conformément au protocole.
- Éliminer l'excès de poils pour le confort du patient.
- Nettoyer la peau autour du tube, de la sonde ou du drain selon le protocole.
- Séchez la peau autour du tube, de la sonde ou du drain.

Postulez :

- Retirez le tampon de son emballage.
- En utilisant la fente, placez le tampon autour du drain, du tube ou de la sonde avec la grille imprimée vers le haut.
- Fixer le tampon avec un enduit adhésif.

Enlever :

- Vérifier régulièrement le tampon ; tandis que le tampon s'absorbe, l'écoulement remontera vers le haut du tampon et une décoloration peut se produire.

- Si l'écoulement s'étend vers le bord du tampon ou si le tampon commence à fuir, le pansement doit être changé.
- Changer le tampon au moins tous les 7 jours ou selon le protocole prescrit.
- Détacher soigneusement le pansement adhésif de la peau.
- Retirez le tampon.
- Si le tampon adhère à la peau, le tampon doit être imbibé d'une solution saline physiologique régulière et légèrement relâché.

Afbeeldingen

