



Numéro d'article	040702
Prix HT	10,35 €
Prix TTC	12,52 €
Stock	en stock

Description

Émulsion lamiderm - Cicatrisation des plaies. Emulsion qui accélère la cicatrisation des coupures et des brûlures.

Indication:

- Brûlures au 1er et 2ème degré
- Plaies non infectées
- Coup de soleil
- Rougeur de la peau due à la radiothérapie

Propriétés :

- Gel-crème
- Hydratant
- Apaisant

- Guérison
- Restaure la peau

Études :

- Fournit un environnement humide qui favorise la guérison (étude 1. 2008)
- Restaure les brûlures superficielles (étude 2 SSD. 2004)
- Gel versus émulsion également efficace en irradiation (étude 3. 2008)
- Réduit significativement l'intensité de la dermatite aiguë lorsqu'elle est irradiée (étude 4. 2012)
- Accélère la cicatrisation des coupures et brûlures (étude Arch Derm Res. 2015)
- Accélère la formation de macrophages dans la plaie pendant 4 à 24 heures au lieu de 48 à 96 heures: améliore la cicatrisation des plaies épidermiques peu profondes (étude Coulomb 1997).
- Guérison plus rapide dans les interventions chirurgicales (Mohs) avec Lamiderm qu'avec la bacitracine (étude Kircik 2007)
- Efficace dans la cicatrisation des plaies après cryothérapie et électrodéshydratation (déshydratation) et curetage (étude Del Rosso 2007)

Composition Eau purifiée, stéarate d'éthylène glycol, liquide mince de paraffine, pentanediol, acide stéarique, paraffine solide, perhydrosqualène, huile d'avocat, alginate de sodium, trolamine, cétypalmitate, sorbate de potassium, parfum honelia.