

# INADINE™ in 10 feiten



**1 INADINE™ is geïndiceerd voor deze onderstaande wonden**

- Ulceratieve wonden
- Diabetische ulcera
- Hechtingen
- Huid - en ander trauma
- Brandwonden

**2 INADINE™ is effectief**

Het heeft een brede activiteit in het antimicrobieel spectrum, zelfs tegen MRSA<sup>1</sup>.

**3 INADINE™ is veilig wanneer op de voorgeschreven manier gebruikt**

Ja, INADINE™ is geschikt voor gebruik bij volwassenen en kinderen, maar moet onder medische supervisie worden toegepast bij pasgeboren baby's en kinderen jonger dan 6 maanden.

**4 INADINE™ bevat 10% povidonjodium (<1% vrij jodium)**

Hoeveelheden worden gewoonlijk gecontroleerd en geëlimineerd door patiënten met een normale schildklier functie.

**5 INADINE™ kan worden gebruikt bij patiënten met schildklierproblemen**

INADINE™ moet onder medische supervisie worden gebruikt bij patiënten met aandoeningen van de schildklier. Patiënten die worden behandeld met thyroxine T3 en T4 niveaus moeten worden gecontroleerd en elke verandering is een indicatie om het productgebruik te stoppen.

*Wij adviseren u om voor gebruik de gebruiksinstructies te raadplegen.*

**6 INADINE™ kan worden gebruikt bij patiënten met diabetes**

INADINE™ is niet gecontraïndiceerd voor patiënten met diabetes.

**7 INADINE™ kan profylactisch worden gebruikt**

Sommige producten met jodium geven aan dat het gebruik hiervan tot een maximale duur van 3 maanden beperkt moet worden. Echter bevatten die producten een significant grotere hoeveelheid vrij jodium, welke mogelijk systemisch opgenomen kan worden. Er moet medische supervisie zijn wanneer INADINE™ langer dan 1 week wordt gebruikt. Echter is er geen strikte limiet voor de duur van het gebruik van INADINE™ wanneer toegepast onder medische supervisie. Wij adviseren dat er volgens protocol regelmatig evaluatie plaatsvindt van de wond en het gebruik van een wondverband.

**8 Het is bewezen dat INADINE™ de wondgenezing niet vertraagt**

In een breed gedragen onderzoek naar povidonjodium en wondgenezing, werd geconcludeerd dat producten met povidonjodium geen schadelijk effect hebben op de wondgenezing<sup>2</sup>.

**9 Door INADINE™ ontstaat geen permanente verkleuring**

**10 INADINE™ heeft een visuele indicator voor verband wisselen**

INADINE™ verandert van kleur van oranje naar wit door de voortdurende afgifte van povidonjodium. Zodra de kleur is veranderd naar wit, is het tijd het verband te verwisselen.

# Betrouwbaar efficiënt en niet-klevend




## GEBRUIKSRICHTLIJNEN

### VÓÓR AANBRENGEN


Raadpleeg de gebruiksinstructies. Kies een maat INADINE™ die iets groter is dan de wond. Bereid de wond voor volgens het desbetreffende wondbehandelingsprotocol. Zorg dat de huid rond de wond droog is. Neem het verband uit de doos.

#### Verband voorbereiden




1. Indien nodig kan **INADINE™** op maat worden geknipt met een schone schaar of worden gevouwen.
2. Dit gaat het makkelijkst als één of beide afdekpapertjes van **INADINE™** nog niet zijn verwijderd.

#### Verband aanbrengen



1. Verwijder een van de afdekpapertjes.
2. Neem het verband van het andere afdekpapertje en plaats **INADINE™** direct op de wond.

#### Secundair verband aanbrengen



1. Bedek **INADINE™** met een secundair verband, bijvoorbeeld **KERRAFOAM GENTLE BORDER™**. Kies het secundaire verband op basis van de hoeveelheid exsudaat. Tot slot kunt u een extra afdekking of retentie-/compressieverband aanbrengen.

#### Verband vervangen of verwijderen



1. Als de kleur van het **INADINE™**-verband vervaagt, is de antiseptische werkzaamheid afgenomen en moet het verband worden vervangen. Aan het begin van de behandeling of in geval van ernstig geïnfecteerde of sterk exsuderende wonden kan het tot tweemaal daags worden vervangen.
2. Verwijder het secundaire verband voorzichtig.
3. Het verwijderen van **INADINE™** kan eenvoudiger worden gemaakt door voorzichtig aan twee diagonaal tegenover elkaar liggende hoeken van het verband te trekken.

INADINE™		
Afmeting	Verbanden per doos	Product code
5cm x 5cm	25	P01481
9,5cm x 9,5cm	25	P01512
9,5cm x 9,5cm	10	P01491

Neem voor meer informatie over de voordelen van **INADINE™** contact op met uw account manager of kijk op [gdmedical.nl](http://gdmedical.nl)

Referenties 1.Sibbald, R.G. et al. Iodine Made Easy. Wounds International 2011; 2(2). 2.Langley, S.R.N. INADINE® wound dressings speed healing, reduce patient discomfort and cuts costs by almost 40%. Burns 1989 Vol.15. 3.Vowden, P. and Cooper, R.A. An integrated approach to managing wound infection Position Document: Management of wound infection. European Wound Management Association (EWMA). London: MEP Ltd, 2006. 4.Balmforth, V. INADINE Povidone Iodine non adherent dressing as a treatment for superficial wounds infected with Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Case Study, 1996. 5.Gordon, J. Clinical significance of methicillin-sensitive and methicillin resistant Staphylococcus aureus in UK hospitals and the relevance of povidone iodine in their control. Postgrad. Med J. 1993, 69(3):106-116. 6.Han, H.K. and Maitra, A.K. Management of partial-thickness burns with Inadine dressings. Burns 1989, 15(6):399-402. 7.Campbell, N. and Campbell, D. Evaluation of a non-adherent, povidone-iodine dressing in a case series of chronic wounds. JWC 2013, Vol. 22(8). 8. Witkowski, K. Practice Improvements Related to the Use of Antimicrobial/Antiseptic Products. Poster CAWC 2011. 9. Jeffcoate, W.J. et al. Randomised controlled trial of the use of three dressing preparations in the management of chronic ulceration of the foot in diabetes. Health Technology Assessment 2009; Vol. 13: No. 54.